




## **mittelfrühe, vorwiegend festkochende Speisesorte**

- gelbe Fleischfarbe
- breite Nematodenresistenz und -toleranz
- wasch- und packfähig
- keimruhige Lagersorte

OLIVIA - ertragsstarke, vorwiegend festkochende Speisequalität mit breiten Resistenzen

Anbauempfehlung				
<b>Standortansprüche</b>	mittlere bis bessere Böden; Standorte, die zu Eisenfleckigkeit neigen, sollten gemieden werden			
<b>Pflanzung</b> 	<b>Pflanzgutsortierung</b> 35/50	<b>Reihenweite</b>		<b>Knollen/ha</b>
		<b>75 cm</b>	<b>90 cm</b>	
		30-32 cm	25-27 cm	43.000
	für großfallende Partien + 2 cm			
	<b>Pflanztiefe</b>	Standard		
<b>Vorbereitung</b>	besitzt eine gute Keimruhe; Pflanzgut vor dem Legen gleichmäßig anwärmen (7-10 Tage)			
<b>Beizung</b>	gegen Rhizoctonia wird empfohlen			
<b>Herbizide</b>	zeigt eine mittlere Empfindlichkeit gegenüber Metribuzin im Nachauflauf*			
<b>Blattgesundheit</b>	gute, durchschnittliche Blattgesundheit; dennoch empfiehlt sich der regelmäßige Einsatz von Fungiziden			
<b>Ernte</b>	auf schonendes Roden ist zu achten			
Düngung inkl. Rücklieferung Vorfrucht für Ertragsniveau 500 dt/ha bei mittlerer Versorgungsstufe				
<b>Stickstoff (N)</b>	140 kg/ha inkl. Nmin, inkl. org. Düngung	2/3 vor dem Pflanzen und 1/3 nachdüngen		
<b>Phosphor (P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>)</b>	100 kg/ha	wasserlösliches Phosphat zum Pflanzen		
<b>Kalium (K<sub>2</sub>O)</b>	350-270 kg/ha	< 35 BP Gaben teilen; bis 150 kg/ha Chlorid möglich		
<b>Magnesium (MgO)</b>	70 kg/ha	zur Ertrags- und Qualitätssicherung		
Sorteneigenschaften				
<b>Reifezeit</b>	mittelfrüh	<b>Knollenmerkmale</b> Form Augenlage Fleischfarbe Schalenfarbe Schale Knollenzahl	oval sehr flach - flach tiefgelb gelb glatt mittel	
<b>Speisewert</b>	vorwiegend festkochend, sehr geringe Kochdunklung			
<b>Ertrag</b>	hohe Erträge bei einer gleichmäßig mittel- bis großfallenden Sortierung	<b>Resistenzen</b> Nematoden  Nematodentoleranz	Ro1 (9), Ro2/3 (9), Ro5 (9) Pa2 (8), Pa3 (8) tolerant	
<b>Jugendentwicklung</b>	zügig	<b>Anfälligkeiten</b> Schorf Eisenfleckigkeit Schwarzfleckigkeit Beschädigung	gering mittel gering mittel - hoch	
<b>Lagerung</b>	sehr keimruhig, Lagerung bis an den Anschluss (Mai/Juni)			

\*vorläufig

Die Angaben zu den Sorten beruhen auf Ergebnissen der offiziellen Sortenversuche und/oder eigenen Erfahrungen. Da Kartoffeln aber ein Naturprodukt sind, kann keine Haftung für die Angaben übernommen werden. (Stand 01/2022)